

Tyrimai, kuriuos galite gauti nemokamai:

Paslauga	Kiek kartų skiriamas	Sąlygos tyrimo skyrimui
<p>Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma.</p> <p>Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</p>	*Jei atitinka sąlygas.	Skiriama, įtariant viršutinių kvėpavimo takų bakterinės kilmės infekciją, jeigu A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno testas yra neigiamas.
Greitojo rota ir adeno viruso ar greitojo rota, adeno ir noro viruso antigeno testo atlikimas (išmatų mėginys)	*Jei atitinka sąlygas.	Įtariant virusinės kilmės viduriavimą.
<p>Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas, esant Helicobacter pylori infekcijai būdingų simptomų. (Išmatų mėginys)</p> <p>Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas po taikyto Helicobacter pylori infekcijos gydymo (Išmatų mėginys)</p>	<p>1 kartą per metus, jei nebuvo diagnozuota infekcija ir nebuvo taikytas gydymas ir atitinka skyrimo sąlygas.</p> <p>Tik po gydymo 1 kartą, ne anksčiau kaip 4 sav. baigus antibiotikus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, jei yra bent viena iš Helicobacter pylori infekcijai būdingų sąlygų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. neaiškios kilmės dispepsija; 2. po skrandžio rezekcijos; 3. jei įtariama ar diagnozuota skrandžio opa, erozija ir jei Helicobacter pylori testas nebuvo atliekamas; <p>Užbaigus Helicobacter pylori infekcijos gydymą.</p>
Vitamino B12 (kobalamino) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą arba nustatyta skrandžio patologija (pvz.: po skrandžio rezekcijos ar mažinimo operacijos).
Vitamino B9 (folinės rūgšties) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą.
Vitamino D (25-OH) tyrimo atlikimas	<p>Ne daugiau 2 kartus per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Tyrimas skiriamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prieš pradėdant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A sąrašą. Jeigu nustatomas VitD trūkumas, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. 2. tęsiant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į A sąrašą, tyrimas atliekamas 1 kartą per metus.
Laisvo tiroksino (LT4) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Tyrimas skiriamas, įtariant tirotoksikozę, kai TTH tyrimo rezultatas yra mažesnis nei norma ir atsiranda klinikinių tirotoksikozės (hipertirozės) simptomų.
Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama, kai TTH tyrimo rezultatas yra didesnis nei norma ir yra hipotirozės požymių.

Tyrimai, kuriuos galite gauti nemokamai:

Paslauga	Kiek kartų skiriamas	Sąlygos tyrimo skyrimui
<p>Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma.</p> <p>Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</p>	*Jei atitinka sąlygas.	Skiriama, įtariant viršutinių kvėpavimo takų bakterinės kilmės infekciją, jeigu A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno testas yra neigiamas.
Greitojo rota ir adeno viruso ar greitojo rota, adeno ir noro viruso antigeno testo atlikimas (išmatų mėginys)	*Jei atitinka sąlygas.	Įtariant virusinės kilmės viduriavimą.
<p>Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas, esant Helicobacter pylori infekcijai būdingų simptomų. (Išmatų mėginys)</p> <p>Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas po taikyto Helicobacter pylori infekcijos gydymo (Išmatų mėginys)</p>	<p>1 kartą per metus, jei nebuvo diagnozuota infekcija ir nebuvo taikytas gydymas ir atitinka skyrimo sąlygas.</p> <p>Tik po gydymo 1 kartą, ne anksčiau kaip 4 sav. baigus antibiotikus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, jei yra bent viena iš Helicobacter pylori infekcijai būdingų sąlygų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. neaiškios kilmės dispepsija; 2. po skrandžio rezekcijos; 3. jei įtariama ar diagnozuota skrandžio opa, erozija ir jei Helicobacter pylori testas nebuvo atliekamas; <p>Užbaigus Helicobacter pylori infekcijos gydymą.</p>
Vitamino B12 (kobalamino) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą arba nustatyta skrandžio patologija (pvz.: po skrandžio rezekcijos ar mažinimo operacijos).
Vitamino B9 (folinės rūgšties) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą.
Vitamino D (25-OH) tyrimo atlikimas	<p>Ne daugiau 2 kartus per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Tyrimas skiriamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prieš pradėdant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A sąrašą. Jeigu nustatomas VitD trūkumas, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. 2. tęsiant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į A sąrašą, tyrimas atliekamas 1 kartą per metus.
Laisvo tiroksino (LT4) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Tyrimas skiriamas, įtariant tirotoksikozę, kai TTH tyrimo rezultatas yra mažesnis nei norma ir atsiranda klinikinių tirotoksikozės (hipertirozės) simptomų.
Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama, kai TTH tyrimo rezultatas yra didesnis nei norma ir yra hipotirozės požymių.